



Teil 9: Widerspruchsbeweis

Im letzten Abschnitt haben wir den direkten Beweis kennengelernt. Wir lernen nun eine noch vielseitigere Beweistechnik kennen: den *Widerspruchsbeweis*.

Vorüberlegung:

- Widerspruch = falsche Aussage (F). Beispiel:
 - falsche mathematische Aussage: $1 = 2$ oder $2/3 \in \mathbb{N}$,
 - inkonsistente logische Aussage, z.B. $A \wedge \bar{A}$.
- Angenommen, wir könnten mittels einer Argumentationskette

$$A \rightarrow A_1 \rightarrow A_2 \rightarrow \dots \rightarrow F$$

aus einer Aussage A eine falsche Aussage F (= Widerspruch) ableiten.

- Wenn jeder der Zwischenschritte korrekt war, muss A falsch sein. Warum?
 - Es gilt: $((A \rightarrow B) \wedge \bar{B}) \rightarrow \bar{A}$ (*Modus Tollens*).
 - In Worten: Ist $A \rightarrow B$ ein gültiger Schluss und B falsch, so ist A auch falsch.
 - Die „Falschheit“ von F wird also von rechts nach links auf A übertragen.
- Da A falsch ist, muss $\bar{A}$ wahr sein.
- Analog zeigt man, dass A wahr ist, wenn man aus $\bar{A}$ einen Widerspruch ableitet.

1 Beweis einfacher Aussagen

Ziel: Beweis einer Aussage A .

Beweisstruktur

- Ausgangspunkt: Die zu beweisende Aussage A ist falsch, d. h. $\bar{A}$ ist wahr.
- Vorgehen: Ableiten einer Argumentationskette bis zu einem Widerspruch:

$$\bar{A} \rightarrow A_1 \rightarrow A_2 \rightarrow \dots \rightarrow F.$$

- Beim Erreichen eines Widerspruchs wissen wir: Die Aussage $\bar{A}$ war falsch.
- Die Negation $\bar{\bar{A}}$ muss somit wahr sein. Da $\bar{\bar{A}}$ äquivalent zu A ist, ist auch A wahr.

- Alle Zwischenschritte müssen bewiesen bzw. begründet sein.

Beispiel 1: Wir beweisen: 5 ist nicht gerade.

Widerspruchsbeweis. Durch Negation der zu beweisenden Aussage erhalten wir die Widerspruchsannahme: 5 ist gerade. Zum Zwecke eines Widerspruchsbeweises nehmen wir also an, 5 wäre eine gerade Zahl und leiten daraus eine falsche Aussage ab:

Aussage	Begründung
5 ist gerade	(Widerspruchsannahme)
$\rightarrow \exists m \in \mathbb{N}: 5 = 2 \cdot m$	(Definition „gerade“)
$\rightarrow \exists m \in \mathbb{N}: 5/2 = m$	(Beidseitiges Teilen durch 2 erhält Gleichheit)
$\rightarrow 5/2 \in \mathbb{N}$	(Vereinfachen)
$\rightarrow F$	(Axiom: $5/2 \notin \mathbb{N}$)

Hier liegt offenbar ein Widerspruch vor, da keine natürliche Zahl mit dem Wert $5/2$ existiert. Da alle Zwischenschritte schlüssig begründet und offenbar korrekt sind, muss unsere Widerspruchsannahme falsch sein. Deren Negation ist also wahr: 5 ist nicht gerade. $\square$

Aufgabe 1: Beweisen Sie per Widerspruchsbeweis:

- (a) 5 ist nicht durch 4 teilbar ($4 \nmid 5$).
- (b) 10 ist gerade.
- (c) $4 \geq 2$
- (d) 6 ist nicht prim.
- (e) 5 ist prim.

2 Beweis von All-Aussagen

Ziel: Beweis einer Aussage der Form $\forall n \in \mathbb{N}: A(n)$.

Vorüberlegung:

- Angenommen, die zu beweisende Aussage $\forall n \in \mathbb{N}: A(n)$ ist falsch.
- Dann muss die Negation $\exists n \in \mathbb{N}: \overline{A(n)}$ der zu beweisenden Aussage wahr sein.
- Die Negation der zu beweisenden Aussage nennen wir *Widerspruchsannahme*.
- Können wir zeigen, dass aus der Widerspruchsannahme eine falsche Aussage folgt,
 - muss die Widerspruchsannahme ebenfalls falsch sein,
 - muss die ursprünglich zu beweisende Aussage wahr sein.

Beweisstruktur:

- Ausgangspunkt: Widerspruchsannahme: $\exists n \in \mathbb{N}: \overline{A(n)}$.
- Vorgehen: Wir leiten mit einer Argumentationskette

$$\exists n \in \mathbb{N}: \overline{A(n)} \rightarrow A_1(n) \rightarrow A_2(n) \rightarrow \dots \rightarrow F$$

aus unserer Widerspruchsannahme eine falsche Aussage (= Widerspruch) F ab.

- Alle Zwischenschritte müssen bewiesen bzw. begründet sein.

Beispiel 2: Wir beweisen: Für alle natürlichen Zahlen n gilt: $2n + 1$ ist nicht gerade.

Durch Negation des zu beweisenden Satzes erhalten wir die Widerspruchsannahme:

$$\begin{aligned} & \overline{\forall n \in \mathbb{N}: 2n + 1 \text{ nicht gerade}} \\ \Leftrightarrow & \quad \exists n \in \mathbb{N}: \overline{2n + 1 \text{ nicht gerade}} \\ \Leftrightarrow & \quad \exists n \in \mathbb{N}: 2n + 1 \text{ gerade.} \end{aligned}$$

Widerspruchsbeweis.

Aussage	Begründung
$\exists n \in \mathbb{N}: 2n + 1 \text{ gerade}$	(Widerspruchsannahme)
$\rightarrow \exists n, m \in \mathbb{N}: 2n + 1 = 2m$	(Definition „gerade“)
$\rightarrow \exists n, m \in \mathbb{N}: n + 1/2 = m$	(Division durch 2 erhält Gleichheit)
$\rightarrow \exists n \in \mathbb{N}: n + 1/2 \in \mathbb{N}$	(Vereinfachung)
$\rightarrow F$	$(\forall n \in \mathbb{N}: n + 1/2 \notin \mathbb{N})$

□

Aufgabe 2: Beweisen Sie folgende Aussagen per Widerspruchsbeweis:

- (a) $\forall n \in \mathbb{N}: 4n + 6$ ist gerade.
- (b) Für keine natürliche Zahl n gilt: $n < n$.
- (c) Es gibt keine natürlichen Zahlen m und n , sodass gilt:

$$\frac{1}{m+n} = \frac{1}{m} + \frac{1}{n}.$$

- (d) * Für alle natürlichen Zahlen $x, y \in \mathbb{N}$ gilt: $x + y \geq 2\sqrt{xy}$.

3 Beweis von Implikationen

Ziel: Beweis einer Aussage der Form $\forall n \in \mathbb{N}: A(n) \rightarrow B(n)$.

Vorüberlegung:

- Sei $A \rightarrow B$ eine Implikation.
- Wie die folgende Wahrheitswerttabelle zeigt, ist $\overline{A \rightarrow B}$ äquivalent zu $A \wedge \overline{B}$

A	B	$\overline{B}$	$A \wedge \overline{B}$	$\overline{A \rightarrow B}$
W	W	F	F	F
W	F	W	W	W
F	W	F	F	F
F	F	W	F	F

- Die Negation von $A(n) \rightarrow B(n)$ ist also äquivalent zu $A(n) \wedge \overline{B(n)}$.

Beweisstruktur

- Ausgangspunkt: Widerspruchsannahme (= Negation der zu beweisenden Aussage):

$$\begin{aligned} & \overline{\forall n \in \mathbb{N}: A(n) \rightarrow B(n)} \\ \Leftrightarrow & \quad \exists n \in \mathbb{N}: \overline{A(n) \rightarrow B(n)} \\ \Leftrightarrow & \quad \exists n \in \mathbb{N}: A(n) \wedge \overline{B(n)} \quad \text{Wichtig: Wir verwenden diese Form!} \end{aligned}$$

- Vorgehen: Ableiten einer Argumentationskette

$$\left(\exists n \in \mathbb{N}: A(n) \wedge \overline{B(n)} \right) \rightarrow A_1(n) \rightarrow A_2(n) \rightarrow \dots \rightarrow F$$

bis zu einem Widerspruch.

- Alle Zwischenschritte müssen bewiesen bzw. begründet sein.

Beispiel 3: Für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt: Wenn n nicht gerade ist, dann ist $n/2$ keine natürliche Zahl.

Struktur der zu beweisenden Aussage:

$$\forall n \in \mathbb{N}: \underbrace{n \text{ nicht gerade}}_{A(n)} \rightarrow \underbrace{n/2 \notin \mathbb{N}}_{B(n)}$$

Durch Negation der zu beweisenden Aussage erhalten wir die Widerspruchsannahme:

$$\begin{aligned} & \overline{\forall n \in \mathbb{N}: n \text{ nicht gerade} \rightarrow n/2 \notin \mathbb{N}} \\ \Leftrightarrow & \quad \exists n \in \mathbb{N}: \overline{n \text{ nicht gerade} \rightarrow n/2 \notin \mathbb{N}} \\ \Leftrightarrow & \quad \exists n \in \mathbb{N}: n \text{ nicht gerade} \wedge n/2 \in \mathbb{N}. \end{aligned}$$

Widerspruchsbeweis.

Aussage	Begründung
$\exists n \in \mathbb{N}: n \text{ nicht gerade} \wedge n/2 \in \mathbb{N}$	(Widerspruchsannahme)
$\rightarrow \exists n \in \mathbb{N}: \overline{\exists m \in \mathbb{N}: n = 2m} \wedge n/2 \in \mathbb{N}$	(Definition „gerade“)
$\rightarrow \exists n \in \mathbb{N}: \overline{\exists m \in \mathbb{N}: n/2 = m} \wedge n/2 \in \mathbb{N}$	(Beids. Division durch 2 erhält Gleichheit)
$\rightarrow \exists n \in \mathbb{N}: n/2 \notin \mathbb{N} \wedge n/2 \in \mathbb{N}$	(Vereinfachung)
$\rightarrow \text{F}$	(Inkonsistente logische Aussage)

Hier liegt offenbar ein Widerspruch vor, da $n/2$ nicht gleichzeitig natürlich und nicht natürlich sein kann. $\square$

Aufgabe 3: Beweisen Sie folgende Aussagen per Widerspruchsbeweis:

- (a) Für alle natürlichen n gilt: Wenn n gerade ist, dann ist $n + 1$ nicht gerade.
- (b) Für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt: Wenn n gerade ist, dann ist n^2 ebenfalls gerade.
- (c) Für alle natürlichen Zahlen x und y gilt: Wenn $x < y$, dann $y \geq x$.
- (d) $\forall x, y \in \mathbb{N}: (x^2 + y = 11 \wedge y \neq 7) \rightarrow x \neq 2$
- (e) Für alle natürlichen n gilt: Wenn $n < m$, dann ist $n - m \notin \mathbb{N}$.