Teil 11: Beweis per Kontraposition

Nach dem direkten Beweis und dem Widerspruchsbeweis werden wir nun eine dritte Beweistechnik für All-Aussagen $\forall n \in \mathbb{N}\colon A(n) \to B(n)$ betrachten: Den Beweis per *Kontraposition*.

Ziel: Nachweis einer Aussage $\forall n \in \mathbb{N}\colon A(n) \to B(n)$.

Vorüberlegung:

- Wie die folgende Wahrheitswerttabelle zeigt, ist $A \to B$ äquivalent zu $\overline{B} \to \overline{A}$.

A	B	$\overline{A}$	$\overline{B}$	$\overline{B} \to \overline{A}$	$A \to B$
W	W	F	F	W	W
W	F	F	W	F	F
F	W	W	F	W	W
F	F	W	W	W	W

- Die Implikation $A \to B$ ist also genau dann wahr, wenn $\overline{B} \to \overline{A}$ wahr ist.
- Um $A \to B$ zu beweisen, können wir stattdessen auch $\overline{B} \to \overline{A}$ beweisen.
- Das kann deutlich einfacher sein!

Beweisstruktur:

- Direkter Beweis der äquivalenten Aussage $\forall n \in \mathbb{N}\colon \overline{B(n)} \to \overline{A(n)}$.
- Ausgangspunkt (*Prämisse*): $\overline{B(n)}$.
- Vorgehen: Ableiten einer Argumentationskette

$$\overline{B(n)} \Rightarrow A_1(n) \Rightarrow A_2(n) \Rightarrow \ldots \Rightarrow \overline{A(n)}.$$

- Alle Zwischenschritte müssen bewiesen (bzw. begründet) sein.

Beispiel 1: Wir beweisen folgenden Satz.

Satz 1. *Für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt: Wenn n^2 nicht durch 2 teilbar ist, dann ist n ebenfalls nicht durch 2 teilbar.*

Struktur des Satzes: $\forall n \in \mathbb{N}\colon A(n) \to B(n)$ mit

- $A(n)\colon n^2$ ist nicht durch 2 teilbar.

- $B(n)$: n ist nicht durch 2 teilbar.

$\rightarrow$ $\overline{A(n)}$: n^2 ist durch 2 teilbar.

$\rightarrow$ $\overline{B(n)}$: n ist durch 2 teilbar.

Beweis per Kontraposition. Sei $n \in \mathbb{N}$ eine beliebige natürliche Zahl.

	Aussage	**Begründung**
	n ist durch 2 teilbar	(Prämisse)
$\Rightarrow$	$\exists m \in \mathbb{N}: n = 2 \cdot m$	(Definition „teilbar“)
$\Rightarrow$	$\exists m \in \mathbb{N}: n^2 = (2 \cdot m)^2$	(Beidseitiges Quadrieren erhält Gleichheit)
$\Rightarrow$	$\exists m \in \mathbb{N}: n^2 = 4m^2$	(Ausmultiplizieren)
$\Rightarrow$	$\exists m \in \mathbb{N}: n^2 = 2 \cdot (2 \cdot m^2)$	(Ausklammern eines Faktors 2)
$\Rightarrow$	$\exists k \in \mathbb{N}: n^2 = 2k$	(Für $k = 2m^2$)
$\Rightarrow$	n^2 gerade	(Definition „gerade“)

□

Aufgabe 1: Könnte man $\forall n \in \mathbb{N}: \overline{B(n)} \rightarrow \overline{A(n)}$ auch per Widerspruchsbeweis beweisen?

Aufgabe 2: Beweisen Sie folgende Aussagen per Kontraposition:

(a) Für alle $m, n, k \in \mathbb{N}$: $m \neq n \rightarrow m + k \neq n + k$.

(b) Für alle $m, n \in \mathbb{N}$: $mn \geq 100 \rightarrow (m \geq 10 \vee n \geq 10)$.

(c) Für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt: Wenn n prim ist, dann ist $n = 2$ oder n^2 ist nicht gerade.

(d) Für alle $m, n \in \mathbb{N}$ gilt: $m^2 \geq n^2 \rightarrow m \geq n$.

(e) $\forall a, b, c \in \mathbb{N}: (c \nmid ab) \rightarrow (c \nmid a) \wedge (c \nmid b)$